

## Когда нужно сдавать тест на ВИЧ



Первый раз нужно сдавать анализ через три месяца после ситуации, опасной в плане заражения ВИЧ.

### Проявите заботу о своих близких:

- поделитесь своими знаниями о ВИЧ/СПИДе с близкими людьми;
- пройдите тестирование, чтобы выяснить свой ВИЧ-статус;
- планируйте свои отношения в соответствии со своими знаниями о ВИЧ.

Мы расположены по адресу:  
162250  
Вологодская область

г. Харовск, ул. Энергетиков, 14

**Директор**  
**Максимова Светлана Викторовна :**  
тел. (8-817-32) 2-33-04

**Заведующий отделением**  
**Лукьянова Татьяна Сергеевна**  
тел. (8-817-32) 2-34-05

**Специалисты отделения:**  
Наумова Елена Рудольфовна,  
Борисенкова Ирина Николаевна,  
Чеканова Татьяна Николаевна,  
Смирнова Ольга Николаевна,

**Еркова Наталья Александровна**  
тел. (8-817-32) 2-34-05

**Адрес электронной почты:**  
**[khardetdom@mail.ru](mailto:khardetdom@mail.ru)**

**Сайт учреждения:**  
**[cpd-kharovsk.vlq.socinfo.ru](http://cpd-kharovsk.vlq.socinfo.ru)**



**БУ СО ВО**  
**«Харовский центр помощи**  
**детям, оставшимся без**  
**попечения родителей»**

**ВИЧ и СПИД**  
**в чем разница?**



  
2018 год

# ВИЧ и СПИД в чем разница?

## ВИЧ

### Вирус Иммунодефицита Человека.

Этот вирус поражает определенные клетки иммунной системы человека (CD-4), защищающие организм от различных инфекций, именно он и приводит к развитию СПИДа.

## СПИД

### Симптом Приобретенного Иммунодефицита Человека.

Это комплекс заболеваний, которые развиваются в результате разрушения вирусом (ВИЧ) иммунной системы человека. Этот вирус может жить в организме человека многие годы, не вызывая никаких симптомов, и передаваться другим людям до того, как появятся какие-либо признаки заболевания.

Для того, чтобы защитить себя и других, необходимо действовать, опираясь на достоверные факты.




### Как передается вирус:

- при половых контактах с зараженным партнером без использования презерватива;
- при использовании общих с зараженным человеком шприца, иглы или раствора для инъекции;
- при переливании зараженной крови;
- от ВИЧ-инфицированной матери во время беременности, родов и грудного вскармливания.

### Почему

Потому что кровь, сперма, вагинальный секрет— это биологические жидкости, которые содержат ВИЧ в достаточном для заражения количестве.



### Когда вирус не передается:

- при кашле и чихании;
- через посуду и бытовые предметы, которыми пользовался ВИЧ-инфицированный человек;
- при употреблении пищи, приготовленной ВИЧ-инфицированным человеком;
- при контакте с потом и слезами;
- при рукопожатии, объятиях и при поцелуях.

### Почему

Потому что слезы, слюна, пот, моча, рвотные массы—это биологические жидкости, которые содержат ВИЧ в недостаточном для заражения количестве.

**Оставайтесь людьми!**  
ВИЧ не передается через дружбу!

